

- Cominciare l'applicazione in una zona limitata. Un lieve pizzicore è normale. Se il paziente avverte un bruciore intenso significa che la cute è irritabile, in tal caso risciacquare la zona trattata con acqua, interrompere la seduta ed applicare la CREMA NUTRIENTE E IDRATANTE VISO wiQO pelli secche.
- Procedere sempre con la tecnica applicativa su cute ben lubrificata con il prodotto per evitare escoriazioni.
- Evitare la zona perioculare inferiore (zona "borse"). Un gonfiore in questa zona crea un effetto antiestetico nei giorni successivi.
- Trattare ad una ragionevole distanza dall'ultima rasatura o ceretta.
- Non utilizzare guanti in lattice per evitare la possibilità di allergie. Si consigliano guanti in nitrile.
- Non trattare zone con dermatite seborroica (es. lati del naso).
- Non trattare gli angoli della bocca se affetti da chelite angolare.
- Attenzione nel trattare la piega intramammaria per possibile sviluppo di ragadi in caso di cute macerata.
- Attenzione: su pelli seborroiche od acneiche e specie nelle zone delicate del viso, (es. lati bocca) eseguire al massimo due applicazioni successive di PRX-T₃₃, massaggiando con delicatezza. Il rischio è quello che la cute macerata venga abrasa da un massaggio troppo aggressivo con conseguenti possibili esiti cicatriziali.
- L'eventuale uso topico di acido retinoico (isotretinoina) deve essere sospeso 15 giorni prima del trattamento con PRX-T₃₃ e può essere ripreso alla fine del ciclo di sedute.



Linea diretta con i dermatologi e i biologi ricercatori
per quesiti scientifici o di pratica ambulatoriale:
scientificdiv.gpq@wiqo.eu

GPQ srl

Sede operativa: Via Flavia, 23/1 - 34148 Trieste - Italy
Tel.: +39 040 360408 - Fax: +39 040 761393 - gpq@wiqo.eu
www.wiqo.com

PRX-T₃₃[®]
wiQO

PROTOCOLLO D'USO



RIVITALIZZAZIONE VISO E COLLO

Indicazioni:

Photoaging, derma atrofico in pazienti di età media/avanzata.

Frequenza sedute:

1 volta a settimana per 1-5 sedute.

METODO DI APPLICAZIONE

1) Detergere la cute con **P SOLUTION** WiQomed.

2) Applicare una piccola dose di **PRX-T₃₃** su una parte circoscritta dell'area da trattare e massaggiare con l'apposita spatola o con lo specifico massaggio avendo cura di mantenere sempre la zona lubrificata con il prodotto.

3) Ripetere l'applicazione fino all'ottenimento dell'effetto desiderato (turgore visibile e palpabile). Si ottiene ciò con una media di 3 passaggi: 1-2 per il trattamento del collo o delle pelli molto sottili e/o delicate, fino a 5 in caso di pelle molto spessa.

4) Procedere zona per zona fino a trattare tutta la superficie (evitando la zona palpebrale).

5) Eliminare i residui di gel con cotone imbevuto d'acqua. Far risciacquare il paziente con acqua corrente fresca, così facendo percepirà immediatamente la pelle liscia e turgida.

6) Applicare una dose abbondante di **CREMA NUTRIENTE E IDRATANTE VISO** WiQo pelli secche in tutta l'area trattata al fine di ripristinare il film idrolipidico, prevenire la secchezza e lenire l'eventuale arrossamento momentaneo.

7) Prescrivere il post-trattamento domiciliare con **CREMA NUTRIENTE E IDRATANTE VISO** WiQo pelli secche da applicare 2/3 volte al giorno i primi giorni e 1-2 volte al giorno nel mantenimento. Prescrivere inoltre il trattamento domiciliare con **FLUIDO LEVIGANTE VISO** WiQo da applicare una volta al giorno a partire dal giorno successivo al trattamento con PRX-T₃₃ ricordando che va applicato ad almeno un'ora di distanza da qualsiasi altra crema.

RIVITALIZZAZIONE DÉCOLLETÉ O ALTRE ZONE DEL CORPO

Indicazioni:

Photoaging, derma atrofico in pazienti di età media/avanzata.

Frequenza sedute:

4-6 sedute con cadenza settimanale.

METODO DI APPLICAZIONE

1) Applicare il **PRX-T₃₃** con lo specifico massaggio appreso o con l'apposito pennello fino ai quadranti superiori del seno.

2) Prima che il prodotto sia completamente assorbito ed il guanto o la spatola non scorrono più, riapplicare il prodotto. Con 3-5 applicazioni si ottiene l'effetto desiderato (turgore visibile e palpabile).

3) Risciacquare con acqua ed applicare la **CREMA NUTRIENTE E IDRATANTE VISO** WiQo pelli secche.

4) Prescrivere la **CREMA CORPO ELASTICIZZANTE ANTI-SECCHENZA** WiQo che andrà applicata a domicilio una volta al giorno tutti i giorni.

SMAGLIATURE

Indicazioni:

Smagliature recenti (rosee o bianche), smagliature datate (anche in associazione ai laser frazionati).

Frequenza sedute:

1 volta la settimana per 5-15 sedute.

METODO DI APPLICAZIONE

1) Frizionare con l'apposito pennello il **PRX-T₃₃** sulla smagliatura nel senso della lunghezza.

2) Ripetere l'applicazione fino al sollevamento del fondo. Ciò avviene mediamente dopo 3-5 passaggi per le smagliature rosee o sottili e 5-10 per le altre.

3) Eliminare i residui di prodotto con acqua ed applicare la **CREMA NUTRIENTE E IDRATANTE VISO** WiQo pelli secche.

CICATRICI DEPRESSE RECENTI

Indicazioni:

Cicatrici depresse recenti (acne, impetigine, varicella, ecc.) il cui fondo è ancora roseo. Il trattamento va iniziato dopo la completa riepitizzazione della lesione.

Frequenza sedute:

3 volte la settimana per 4-8 settimane fino a che il sollevamento del fondo non rimanga stabile ad un controllo dopo 15 giorni.

METODO DI APPLICAZIONE

1) Frizionare con l'apposito pennello o con un bastoncino ovattato imbevuto di **PRX-T₃₃** il fondo depresso della cicatrice.

2) Ripetere l'applicazione fino al sollevamento del fondo della cicatrice.

3) Eliminare i residui di gel con cotone inumidito con acqua e applicare la **CREMA NUTRIENTE E IDRATANTE VISO** WiQo pelli secche.

Controindicazioni generali all'applicazione del PRX-T₃₃

- Cute irritata
- Cute irritabile
- Dermatite seborroica
- Allergia all'acido cogico
- Allergia al lattice, nel caso si usino guanti in lattice
- Gravidanza e allattamento
- Eruzioni cutanee e/o erpetiche in atto

Eventuali effetti collaterali e problemi:

• **Esfoliazione intensa:** può verificarsi alla prima applicazione su pelli con strato corneo molto spesso. Dura 2-3 giorni. Applicare la **CREMA NUTRIENTE E IDRATANTE VISO** WiQo pelli secche più volte al giorno.

• **Pelle delicata che si arrossa alla prima applicazione:** fermarsi ad una sola applicazione e consigliare la **CREMA NUTRIENTE E IDRATANTE VISO** WiQo pelli secche.

• **Brucciore intenso che si manifesta subito:** può avvenire nei soggetti con pelle irritabile. La diagnosi di "pelle irritabile" è sintomatologica e si rileva quando il soggetto lamenta bruciore dopo l'applicazione di un prodotto acido che nei soggetti normali è comunemente tollerato. In tal caso far risciacquare subito il paziente sotto l'acqua corrente fresca e applicare la **CREMA NUTRIENTE E IDRATANTE VISO** WiQo pelli secche.

• **Arrossamenti immediati:** gli arrossamenti si risolvono in alcune ore con l'applicazione della **CREMA NUTRIENTE E IDRATANTE VISO** WiQo pelli secche.

• **Arrossamenti tardivi diffusi o a chiazze:** si possono manifestare il giorno successivo e si trattano con una crema cortisonica applicata per qualche giorno (in questo caso consigliare di non esporsi al sole).

• **Secchezza:** applicare la **CREMA NUTRIENTE E IDRATANTE VISO** WiQo pelli secche più frequentemente.

• **Allergia all'acido cogico o al lattice dei guanti:** prescrivere una crema cortisonica.

• **Contatto con la congiuntiva:** lavare con soluzione fisiologica sterile.

• **Prurito, con o senza arrossamento, nei giorni successivi:** evento molto raro verosimilmente dovuto a un'allergia all'acido cogico. Prescrivere una crema steroidea.

• **Infiammazioni circoscritte tardive (che compaiono dal giorno successivo):** si presentano con arrossamento e/o gonfiore di una zona limitata di cute trattata e sono verosimilmente dovute a una irritazione su un'area cutanea che al momento dell'applicazione non era perfettamente integra (dermatite subclinica, ceretta recente ecc). Prescrivere una crema steroidea.

• **Evidenziarsi di macchie più scure rotondeggianti nei due giorni successivi:** sono dovute all'essiccazione di aree di cute più ispessita. Scompaiono con la desquamazione in pochi giorni.

Nel caso si dovessero verificare effetti collaterali che provochino un'inflammazione persistente (eritema della durata superiore a un giorno) vi è il rischio di iperpigmentazioni, nei soggetti predisposti, non direttamente dovute all'acido tricloroacetico ma all'eritema. Monitorare i pazienti assicurandosi che non si esponano al sole, che usino il filtro solare ad alta protezione ed eventualmente prescrivere inibitori della tirosinasi.