

WiQO^{med}
Wissenschaftliche Abteilung

Der direkte Kontakt zu Dermatologen und Forschungsbiologen von **WiQO^{med}**
für wissenschaftliche Fragen oder Auskünfte zur ambulanten Patientenbehandlung

www.wiqomed.com
scientificdiv.gpq@wiqo.com



GPQ Srl - Mailand
Produktion und R&D
Tel.: +39 040 360408
Fax: +39 040 761393
contact@wiqomed.com
Via Flavia, 23/1
TRIEST - ITALIEN



Suisse MediCare

Verteiler exklusiv für die Schweiz
Corso Elvezia 23
6900 Lugano (Schweiz)
email: customer@suissemedicare.ch
t. +41 76 402 18 87
web: www.suissemedicare.ch

REVERSE BEAEBZE PEEL

PROTOKOLL FÜR DEN GEBRAUCH DES MEDIZINPRODUKTS



INFOMATERIAL FÜR MEDIZINISCHES FACHPERSONAL

WiQO^{med}

ANZEIGEN

Behandlung von **Melasma** und **Hyperpigmentierung der Haut**.

HÄUFIGKEIT DER ANWENDUNG

Alle 7 bis 30 Tage, nach Ermessen des Arztes. Mit mindestens 3 Sitzungen pro Woche beginnen, dann die Abstände je nach Melasma-Intensität und Verbesserung vergrößern.

GEBRAUCH UND ANWENDUNGSMETHODE

Nachstehende Anweisungen von links nach rechts befolgen:

| RsP 1 | RsP 2 | Neutraliser | RsP 3 | Neutraliser | NACH DER BEHANDLUNG | BEHANDLUNG FÜR ZUHAUSE |
|---|---|--|---|--|---|---|
| Den zu behandelnden Bereich mit P Solution reinigen. Großzügig auf alle betroffenen Stellen auftragen und mit Nitrilhandschuhen einmassieren, bis das Produkt eingezogen ist. Die Anwendung wiederholen. Nach dem vollständigen Einziehen den Bereich mit einem feuchten Pad reinigen. Gut trocknen. | Mit den Nitrilhandschuhen nur auf pigmentierten Stellen oberflächlich auftragen, nicht einmassieren. 3 Minuten* einwirken lassen. Falls der Patient ein Brennen oder Rötungen auftreten, unverzüglich neutralisieren (Neutraliser). | Vor dem Gebrauch schütteln. Produkt auftragen. Die Neutralisierung erfolgt in wenigen Sekunden. Empfindet der Patient ein Brennen, ruhen lassen, bis das Brennen nachlässt. Mit einem angefeuchteten Pad entfernen. Gut trocknen. | Mit den Nitrilhandschuhen nur auf pigmentierten Stellen oberflächlich auftragen, nicht einmassieren. 3 Minuten* einwirken lassen. Falls der Patient ein Brennen von mehr als 5/10 empfindet oder Rötungen auftreten, unverzüglich neutralisieren (Neutraliser). | Vor dem Gebrauch schütteln. Produkt auftragen. Die Neutralisierung erfolgt in wenigen Sekunden. Empfindet der Patient ein Brennen, ruhen lassen, bis das Brennen nachlässt. Mit einem angefeuchteten Pad entfernen. Gut trocknen. | WiQo REVERSE SERUM auftragen und sanft einmassieren, bis es eingezogen ist. WiQo ICP CREAM oder eine andere Sonnenschutzcreme auftragen (LSF 50+). | WiQo REVERSE SERUM zweimal täglich anwenden, solange die Flecken erkennbar sind, dann zur Beibehaltung und Vorbeugung einmal täglich morgens. Umfassender Lichtschutz mit WiQo ICP CREAM oder einer anderen Sonnenschutzcreme (LSF 50+). |

* Bei sehr dicker Haut kann man RsP 2 und RsP 3 bis zu 15 Minuten lang einwirken lassen.

WARNHINWEISE

- Anwendung nur durch Mediziner.
- Medizinprodukt zur Außenanwendung.
- **Besondere Vorsicht bei Phase 2 und Phase 3:**
 - Treten während der Anwendung Rötungen oder starkes Brennen auf, sofort den Neutraliser anwenden.
 - Phase 3 bei stark geröteter Haut oder anhaltendem Brennen nach der Neutralisierung von Phase 2 nicht anwenden.
 - Sofort neutralisieren, falls auf den behandelten Stellen hervorstehende Punkte oder kleine weiße Bereiche auftreten (Neutraliser).
- Bei anhaltendem Brennen oder starkem Hautausschlag nach der Anwendung des Neutraliser und nach dem Abwaschen der Haut eine Steroidcreme auftragen.
- Keine Latexhandschuhe verwenden, sie können Allergien verursachen. Die Verwendung von Nitrilhandschuhen wird empfohlen.
- Nach Rasur oder Wachsen ausreichend Zeit vergehen lassen.
- Augenkontakt vermeiden. Bei Augenkontakt mit Salzlösung gründlich ausspülen, die Lösung stets griffbereit halten.
- Kontakt mit den Schleimhäuten vermeiden. Bei Kontakt mit den Schleimhäuten sofort den Neutraliser auftragen und mit einem feuchten Pad entfernen.
- Das Produkt ist korrosiv.